

ANNEXE I : Classification des patients en quatre groupes

Groupe A	Patient sans symptômes évocateurs de COVID-19 ^(a) et ne relevant pas des groupes B, C et D
Groupe B	Patient sans symptômes évocateurs de COVID-19, sans contact à risque mais à risque accru de développer une forme grave de la maladie ^(b)
Groupe C	Patient sans symptômes évocateur de COVID-19 ^(a) mais en contact étroit avec une personne avérée COVID-19 ou avec des symptômes évocateurs de COVID-19
Groupe D	Patient COVID-19 avéré ou présentant des symptômes évocateurs de COVID-19 ^(a)

^a Principaux signes : Toux, maux de gorge, difficulté respiratoire, essoufflement, perte de goût ou d'odorat, fièvre (>38°C) ou sensation de fièvre, diarrhée, vomissements

^b Principaux facteurs de risque : âge > 65 ans, HTA compliquée, maladie respiratoire chronique, diabète non équilibré, femme enceinte (3^{ème} trimestre), insuffisance cardiaque, obésité (IMC>30), immunodépression congénitale ou acquise

	Groupe A : Patient sans symptômes évocateurs de COVID-19 et ne relevant pas des groupes B, C et D	Groupe B Patient sans symptômes évocateurs de COVID-19, sans contact à risque mais à risque accru de développer une forme grave de la maladie	Groupe C Patient sans symptômes évocateur de COVID-19 mais en contact étroit avec une personne avérée COVID-19 ou avec des symptômes évocateurs de COVID-19	Groupe D Patient COVID-19 avéré ou présentant des symptômes évocateurs de COVID-19
Soins urgents Tout soin qui nécessite une intervention dans les 24 heures EX. : Traitement des pulpites aiguës irréversibles, infections, traumatismes, hémorragies....	OUI	OUI sur plages horaires dédiées aux patients de ce groupe	OUI sur plage horaires dédiées aux patients de ce groupe	OUI sur plage horaires dédiées aux patients de ce groupe
Soins non-urgents	OUI	POSSIBLE si soins ^(a) : sur plages horaires dédiées aux patients de ce groupe	NON Le patient doit être réévalué 14 jours (délai d'incubation) après le dernier contact avec la personne : <ul style="list-style-type: none"> ▪ COVID avérée ➢ Symptomatique 	NON Reporter les soins après la guérison en fonction : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Patient population générale, voir ^(b) ▪ Patient immunodéprimé voir ^(c)

^a Évaluer le rapport bénéfice risque entre le soin à réaliser et le risque du patient (décision conjointe et éclairée entre le praticien et le patient)

^b Au moins 15 jours à partir du début des symptômes en s'assurant d'une absence de fièvre et dyspnée depuis au moins 9 jours

^c Au moins 24 jours à partir du début des symptômes en s'assurant d'une absence de fièvre et de dyspnée depuis au moins 16 jours